



## RAPPORT D'INTERVENTION

Vétérinaire : HERICHER T

Activité : Dentisterie

Date : 10/05/2024

### ANIMAL

Nom : Didou

Espèce : chat

Race : Européen

Date de naissance : 01/05/2022

Sexe : mâle

Propriétaire : AMOUR DE NOS 4 PATTES

### VÉTÉRINAIRE TRAITANT

Nom du vétérinaire : Dr Denise

Localité : Louviers

### Anamnèse

Parodontite + stomatite sur chat FIV+

### Examen sous anesthésie gazeuse à l'isoflurane

Examen parodontal après détartrage supragingival de l'ensemble des dents:

- absence des couronnes de 101, 201, 206, 301, 302, 303, 401 et 402
- stomatite alvéolaire, jugale et caudale
- atteinte parodontale sur 104, 108, 109, 204, 208, 209, 309, 403 et 409
- ulcères gingivaux en regard de 104 et de 204

Radios dentaires :

- persistance des racines de 101 et de 201
- confirmation de l'absence de 206, 301, 302, 303, 401 et 402
- alvéolyse en 104, 108, 109, 204, 208, 209, 309, 403 et 409

Conclusion : Stomatite alvéolaire, jugale et caudale associée à la présence de maladie parodontale

### Chirurgie

En accord avec son propriétaire, compte-tenu des lésions présentes et de la présence d'une séropositivité au FIV, décision de l'extraction de l'ensemble des dents restantes.

Anesthésie locorégionale par blocs nerveux infra-orbitaires et mandibulaires par mélange bupivacaïne + lidocaïne

Réalisation de lambeaux gingivaux sur 101-109, 201-209, 301-309 et sur 401-409

Ouverture de alvéoles dentaires et extractions des dents citées. Curetage des alvéoles dentaires infectées.

Sutures des lambeaux au Monocryl® 4/0.

### Traitement et conduite à tenir

Injections per-opératoires d'antibiotiques : lincomycine

Traitement de la douleur antalgique morphine puis buprénorphine et anti-inflammatoire : meloxicam

Traitement post-opératoire délivré par la clinique:

TRAUMASEDYL® 10 gouttes 3 fois par jour pendant 5 jours puis 2 fois par jour, pendant 20 jours, à commencer ce soir

Meloxicam 0.5 mg/mL, une dose pour son poids, une fois par jour, pendant 20 jours minimum à commencer demain

Clindamycine 11 mg/kg, une fois par jour, au cours du repas, pendant 20 jours minimum, à commencer demain

Donner des nouvelles demain. Contrôle de la cicatrisation gingivale d'ici 20 jours à la clinique de Louviers.

### Recommandations

Laisser votre animal au calme lors du retour à la maison. Il se peut qu'il soit somnolent aujourd'hui ou demain.

**Reprise progressive mais obligatoire** de l'alimentation ce soir ou demain. Ne pas oublier de donner à boire par petite quantité. Donner de **l'alimentation molle exclusivement** pour éviter de solliciter les sutures jusqu'au contrôle de la cicatrisation de la gencive.

**Fort risque de déhiscence de plaie** dû au caractère très inflammatoire et à la finesse de la gencive de Didou, rendant indispensable le port de la collerette pendant au moins 10 jours pour éviter tout frottement sur les fils.

Une fois la gencive correctement cicatrisée, observer l'évolution des sites de stomatite et des ulcères gingivaux. La conduite à tenir dépendra de l'évolution des lésions et de la clinique présentée par Didou.

*Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition, si nécessaire, pour l'interprétation des résultats et l'ajustement du traitement.*

*Confraternellement*

Dr HERICHER T